

什麼是安肺樂易利達？

安肺樂含有兩種成分：umeclidinium 和 vilanterol，透過易利達吸入器使用，可以治療成人患者的慢性阻塞性肺病 (COPD)。

Umeclidinium 和 vilanterol 都屬於支氣管擴張劑，兩種成分合併使用，可以避免肺部肌肉緊縮，維持呼吸道暢通，讓您比較容易吸氣吐氣。

我應該何時使用？

請您務必依照醫師的指示，在每天的相同時間使用安肺樂易利達，有助於改善您日間和夜間的症狀。

可能的副作用

安肺樂易利達跟其他的藥物一樣，有可能導致副作用，但不是每個人都會發生。常見的副作用 (10 人中最多可能有 1 人) 包括喉嚨痛、流鼻涕、臉頰和前額感到壓迫或疼痛、咳嗽、便秘、口乾、上呼吸道感染；關於其他可能的副作用，相關資訊請參閱安肺樂易利達包裝盒內的患者須知。

易利達吸入器



從包裝盒和密封容器中取出易利達吸入器時，蓋子是關上的。

請不要打開蓋子，等到需要用藥的時候再打開。

易利達已經預先裝填藥物，方便使用，推開蓋子就會自動準備劑量。

劑量計數器會顯示吸入器中還有多少劑量，剩餘不到 10 劑時，計數器有一半會顯示紅色，請提早聯絡醫生再開立處方。

使用最後一劑後，劑量計數器一半顯示紅色，並且顯示數字 0，表示吸入器的藥劑已經用完。

注意事項

請勿遮蔽氣孔

準備吸入藥物時，手指請勿遮蔽氣孔。



請勿對著吸入器吹氣

吸藥之前要先慢慢吐氣，但請注意不要對著吸嘴吹氣。



要吸藥時才可以打開蓋子

如果打開蓋子，沒有吸入藥物就關上，就會損失一次藥物劑量。

損失的劑量還是留在吸入器內，不過無法再使用。本產品的設計可以避免意外使用過量藥物，或一次吸入雙倍劑量。

藥物請妥善收存，避免兒童拿取。



如何使用

安肺樂易利達 乾粉吸入劑使用說明

僅提供給醫師開立此處方的使用者



圖片非實際尺寸

請您務必詳閱安肺樂易利達乾粉吸入劑包裝盒內的患者須知，瞭解本藥物的重要資訊。如果對藥物有任何問題，請隨時詢問醫師、護理師或藥師。

1 打開



準備用藥時，請推開蓋子，藥瓶會自動準備一劑的份量，您會聽到「喀嚓」一聲，劑量表也會減少一格。此時表示可以準備吸藥了。

2 吸入



吸入器先不要靠近嘴邊，在適當範圍內先儘量吐氣。

雙唇確實含著吸嘴，不要有空隙。此時長而穩定地深吸一口氣後，取出吸入器，閉氣約3-4秒，慢慢吐氣。

此藥品無明顯味道，只要正確使用吸入器，不需要擔心沒有吸入藥物。

3 關上



隨後，只要將蓋子蓋上，便完成了用藥。

就是這麼簡單！

或可以先用乾的面紙擦拭吸嘴，再蓋上蓋子。吸入器請放在安全的地方，方便隔天再使用。



Theravance

Ellipta™ 為葛蘭素史克藥廠註冊商標
Anoro 及 Ellipta 為 GSK 集團公司註冊商標
Anoro Ellipta 由 GSK 與 Theravance 公司共同研發