



歐服寧 (Warfarin, Orfarin[®] 5 mg/tab)



可化凝 (Warfarin, Cofarin[®] 1 mg/tab)



歐服寧/可化凝是一種抗凝血劑，可以用來治療或預防血栓形成。本院有兩種含量，皆為粉紅色錠劑，每錠含5毫克（標記ORN 18）或1毫克（標記GP/278）之藥量。

如何使用您的藥物？

歐服寧/可化凝的治療必須在醫師的監控下開始。使用劑量會根據定期檢查凝血功能之結果而設定。請遵照醫師處方之劑量使用，未經醫師指示，切勿自行驟然更改劑量或停藥。正常情況下，**歐服寧/可化凝**建議每天服用一次，在固定時間服用。

假如我忘記服藥應該怎麼辦？

想起時立即服用，若接近下次服藥時間，則只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。若連續兩天以上忘記服藥，則請與醫師聯絡，可能需再做劑量調整。

服藥時要注意什麼？

1. 服藥期間請定期回診並做凝血功能檢查，以確認藥物治療效果及是否引起任何可能之副作用。
2. 因為**歐服寧/可化凝**可能與其他西藥或中藥互相影響，就醫時請讓所有照顧您的醫師或藥師知道您正在服用此藥。
3. 日常生活如刷牙、刮鬍子，或從事危險性高的活動時，請注意避免受傷出血。

可能引起的副作用有哪些？

歐服寧/可化凝可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥若發生任何不適，請告知醫師或藥師。

1. 頭痛、胃不舒服、腹瀉、發燒、皮膚紅疹。
2. 此藥可能改變尿液顏色呈橘紅色，此現象

並無害。但若發現尿液帶血或呈紅褐色，需即刻與醫師聯絡。

3. 若有異常出血症狀（如解黑便、血便、牙齦出血、不明原因的瘀青等），請立即與醫師或藥師聯繫。

服藥前須告知醫師的事情：

1. 您有計畫拔牙或施行重大手術。
2. 您有使用酒精性飲料的習慣。
3. 您正在使用其他藥物，包括成藥、中草藥、保健食品等。
4. 您有任何的藥物過敏經驗。
5. 您已經懷孕或者計畫懷孕。
6. 您正在餵母乳。
7. 您有其他疾病，尤其是出血問題（如潰瘍、經期過長或經血過多等）。

有哪些飲食需要注意？

1. 富含維生素K食物會**降低****歐服寧/可化凝**的藥效，過度攝取深綠色蔬菜（如菠菜、甘藍菜、綠色花椰菜、萵苣）或動物肝臟及綠茶時，都可能降低藥效。若需使用，請少量、定量食用。
2. 某些特定食物會**加強****歐服寧/可化凝**的藥效，如大蒜、銀杏、當歸、木瓜、芒果、酒、蔓越莓等，都可能造成藥效太強而出血不止，請避免使用。
3. 若日常飲食習慣有所改變，請告知醫師或藥師。

如何保存藥品：

請連同藥袋儲存於緊密容器內，於室溫、避光、乾燥處保存。並且將藥物放在兒童拿不到的地方。