



美道普錠 250 毫克

美道普 HBS 125 毫克

### 美道普 (Madopar®, Madopar® HBS)



多巴胺(Dopamine)是一種存在於腦部之神經傳導物質。巴金森氏症的患者因為缺少足夠的多巴胺，所以須藉由藥物來補充。多巴胺無法通過血液與腦的分界進入腦部，其新陳代謝的前身左旋多巴胺 (L-dopa) 則可通過此分界線，因此可作為補充多巴胺之療法。  
**美道普錠 250** 錠含 L-dopa 200 毫克及 benserazide 50 毫克，為速效型製劑  
**美道普 125 HBS** 錠含 L-dopa 100 毫克及 benserazide 25 毫克，為緩釋型製劑

在您服用美道普之前，您應該讓醫師或藥師知道您是否有下列情況：

1. 您正在使用其他藥物，其中包括非處方藥、營養補給藥品、草藥等。
2. 您有任何的藥物過敏經驗。
3. 您已經懷孕或者正計劃懷孕。
4. 您正在餵母乳。
5. 您有其他疾病，如青光眼、心肌梗塞、心律不整及胃潰瘍。

#### 應該如何使用美道普？

美道普可於飯前半小時或飯後一小時與一杯白開水一起吞服，若此藥物讓您感到胃不舒服，則可與食物一起併用。請配合醫師或藥師指示服用正確藥量，不要隨意增減藥量，也千萬不要在沒有醫師的允許下擅自停藥。

#### 如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，請不要將兩次的劑量一起服用，直接省略一次劑量，然後依照原訂時間表規律的服用藥物。

#### 服用美道普時可能會發生哪些副作用？

美道普與其他用於治療巴金森氏症的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此，您使用此藥若發生任何不適或者有任何疑問，請通知您的醫師或藥師。  
☆較常見：運動障礙（一種不正常的不隨意運動）、噁心、幻覺、混亂、暈眩、直立性低血壓及口乾、不正常的作夢、嗜睡、健忘、抑鬱、便秘、感覺異常、疲倦

#### 當您在服用美道普期間，應該注意些什麼？

1. 請定期回診，讓您的醫師評估您整個病情的控制情況，並調整至最佳的藥物劑量。
2. 需要站起來或坐下時請慢慢的改變姿勢，尤其是老年人，如此便可以避免頭暈等現象。
3. 緩釋型製劑請不要研磨。
4. 避免與高蛋白食物一起服用，以免減少藥物吸收。

#### 如何保存藥品：

請連同藥袋儲存於緊密容器內，於室溫、避光、乾燥處保存。並且將藥物放在兒童拿不到的地方。