



## 降糖佳錠

Acarbose (Acarose®) 50mg/tab



**降糖佳錠**主要作用為抑制胰臟  $\alpha$ -amylase 及腸內之  $\alpha$ -glucosidase，因而抑制碳水化合物在腸道之分解及吸收，有效的降低飯後血糖。對以飲食、運動及減輕體重仍然不足以控制血糖之非胰島素依賴型(第 2 型)糖尿病有良好的治療效果。本院有 50 毫克白色錠劑。

### 如何使用您的藥物？

**降糖佳錠**的治療必須在醫師的監控下開始。使用劑量是根據定期檢查血糖的結果來設定的。**降糖佳錠**一般建議應該於用餐前，以少量液體，整顆吞服。或用餐時於前數口和食物一起咬碎吞下。

### 假如我忘記服藥應該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。

### 為什麼我要抽血做檢查呢？

服用 **降糖佳錠**需要作血液檢查血糖、糖化血色素、血脂肪及肝腎功能等相關生化檢查值，藉此以確認藥物的治療效果及是否引起任何可能之副作用。

### 降糖佳錠可能引起之副作用？

1. 較常見的副作用如胃腸脹氣、腹瀉、腹鳴及腹痛。
2. 非常少數個案可能發生過敏反應。例如：皮膚發紅、皮疹、蕁麻疹。
3. **降糖佳錠**單獨使用不會引起低血糖反應，但

與「磺醯尿素類」或胰島素合用時，一旦發生低血糖反應，最好馬上口服葡萄糖，而不能使用蔗糖或其他碳水化合物，因為**降糖佳錠**會抑制後者在腸道內之分解吸收。

### 如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 正在使用其他藥物或使用酒精性飲料
2. 有任何的藥物過敏經驗
3. 已經懷孕或者計畫懷孕
4. 正在餵母乳
5. 有其他疾病

### 使用降血糖藥物的一般原則：

1. 適當的飲食及運動是極重要的，即使服用藥物亦不可取代飲食及運動控制的重要性。
2. 不可自行突然停藥。如果有必要停藥，您的醫師會與您溝通，並密切觀察停藥的反應。

### 藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。