



## 必樂寬膜衣錠 Metformin (Glibudon®) 500mg/tab



**必樂寬膜衣錠**是一種雙胍類(biguanide)降血糖藥物，對以飲食、運動及減輕體重仍然不足以控制血糖之非胰島素依賴型(第 2 型)糖尿病有良好的治療效果，有時也適用於因胰島素所引起的糖尿病。本院有 500 毫克錠劑。

### 如何使用您的藥物？

**必樂寬膜衣錠**的治療必須在醫師的監控下開始。使用劑量是根據定期檢查血糖的結果來設定的。投藥時間與劑量分配方式，應該由醫師考量您的生活型態來決定。正常情況下，**必樂寬膜衣錠**建議應該於用餐中或飯後服用。

### 假如我忘記服藥應該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。

### 必樂寬膜衣錠可能引起之副作用？

**必樂寬膜衣錠**與其他用於治療糖尿病的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥若發生任何不適，請告知醫師或藥師。

1. 開始治療可能會出現胃腸方面的不適，如噁心、嘔吐、腹脹或腹瀉，這種現象通常是暫時的，可於用餐時或飯後服用以減少此副作用。
2. 若發生嚴重性疲勞、肌肉痛、失眠、嘔吐、伴有肌肉痙攣的腹痛與全身性不適，則可能是乳酸中毒或糖尿病酮酸中毒之症狀，請立刻停藥並告知醫師。

如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 正在使用其他藥物或使用酒精性飲料
2. 有任何的藥物過敏經驗
3. 已經懷孕或者計畫懷孕
4. 正在餵母乳
5. 有其他疾病

### 使用降血糖藥物的一般原則：

1. 適當的飲食及運動是極重要的，即使服用藥物亦不可取代飲食及運動控制的重要性。
2. 不可自行突然停藥。如果有必要停藥，您的醫師會與您溝通，並密切觀察停藥的反應。

### 藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。