



昇糖精

Glucagon (GlucoGen®) 1 mg/vial



昇糖精可以使肝臟釋放出肝醣進入血中變成葡萄糖，因此可以提升血糖。本院有針劑（含1毫克昇糖精粉末及注射用水）。

如何使用您的藥物？

昇糖精必須經由醫護人員的指導方可開始使用。您的醫師或藥師會告訴您使用的劑量及時間。**昇糖精**用來治療糖尿病患者的嚴重低血糖並由患者的親屬使用。請確實讓您的親屬明瞭，當您有嚴重低血糖反應且無法以口服糖來緩解症狀時，您的親屬可以使用醫師開給您的**昇糖精**以注射的方式來救您。注射的位置為大腿肌肉上部的外側肌肉或皮下。

注意：當您的低血糖症狀獲得改善後，要馬上再服用口服糖，以防止低血糖再度發生。因為，昇糖精只能暫時緩解低血糖的症狀，仍需經由口服糖來補充糖分。

假如我忘記用藥應該怎麼辦？

昇糖精只有在您有嚴重低血糖時才使用，不用在固定時間用藥。

昇糖精可能引起之副作用？

1. 較常見的副作用如噁心、嘔吐、臉部潮紅。
2. 極少數個案可能發生過敏反應，如有以下症狀發生應立即通知醫師，例如：皮膚發紅、呼吸困難、昏厥。

如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 您患有或曾患有腎上腺素腫瘤(癌)
2. 您正在使用其他藥物或使用酒精性飲料
3. 您有任何的藥物過敏經驗
4. 您已經懷孕或者計畫懷孕

5. 您正在餵母乳

6. 您有其他疾病

學習認知低血糖的症狀：

低血糖的症狀包括出冷汗、覺得飢餓、心跳加快、視力模糊、頭昏想睡、意識模糊、頭痛、打冷顫或嘔吐等。

藥品保存方式：

1. 昇糖精需冷藏(2-8°C)保存。
昇糖精在加入注射用水後，應立即使用。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。