



卡貝滋錠 Combivir® (Lamivudine & Zidovudine 150 & 300mg/tab)



卡貝滋是一種可抑制 HIV 病毒繁衍的藥物，服用後可減少感染的機會延緩病情的惡化增加生命週期。**卡貝滋**可單獨使用或者與其他抗反轉錄病毒藥物併用，來治療 HIV 感染的成人及 12 歲以上的兒童。本院 **卡貝滋**為含有 150 毫克 Lamivudine 和 300 毫克 Zidovudine 白灰色膠囊狀膜衣錠。

卡貝滋 可能引起之副作用？

卡貝滋與其他用於治療抗反轉錄病毒藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥若發生任何不適，請告知醫師或藥師。

卡貝滋常見之副作用：頭痛、身體不適、噁心、下痢、嘔吐、上腹部疼痛、發燒及發疹。

卡貝滋較嚴重之副作用：貧血、嗜中性白血球減少症及血小板減少症等。這些副作用較常出現在高劑量及晚期 HIV 疾病病患身上。

為什麼我必須按時規律地使用卡貝滋？

由於服用藥物一段時間，身體就會自動將部份的藥物排泄出體外，於是為了補充被排掉的藥物，所以必須按時規律地服用以使藥物維持在有效的治療濃度。

假如我忘記服藥應該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。

為什麼我要抽血做檢查呢？

服用 **卡貝滋**有時需要作血液檢查 CD4 數值、病毒量以及肝腎功能的相關生化檢查值，藉此以確認藥物的療效及是否引起任何可能之副作用。

如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 您正在使用其他藥物。
2. 您有任何的藥物過敏經驗。
3. 您已經懷孕或者計畫懷孕。
4. 您正在餵母乳。
5. 您有其他疾病。

使用抗 HIV 病毒藥物的一般原則：

1. 斷斷續續服藥極容易使病毒產生抗藥性，療效非常不好，因此請務必遵從醫師囑咐，按時服藥。
2. 使用抗 HIV 病毒藥物並不能避免病毒的傳染，請您從事性行為之前採取安全的防護措施，以保護您的伴侶。
3. 此份資料無法提供所有可能的注意事項及副作用，因此若是您服用藥物發生任何問題，請告知您的醫師或藥師。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。