




## 衛滋錠 Viramune® (Nevirapine) 200mg/tab



**衛滋**是一種可抑制 HIV 病毒繁衍的藥物。**衛滋**一般和其他抗反轉錄病毒藥物併用，治療免疫缺陷逐漸惡化或嚴重 HIV-1 感染之成年病患。本院有 200 毫克白色錠劑。

### 衛滋可能引起之副作用？

衛滋與其他用於治療抗反轉錄病毒藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥若發生任何不適，請告知醫師或藥師。

**衛滋**最常見之副作用：皮膚疹、肝功能異常、噁心、嘔吐、倦怠、發燒、肌痛、頭痛、下痢、腹痛、腹瀉、嗜睡。

**衛滋**和其他抗反轉錄病毒藥物併用可能之副作用：貧血、顆粒性白血球減少、胰臟炎、周邊神經炎、血小板減少。

### 為什麼我必須按時規律地使用衛滋？

由於服用藥物一段時間，身體就會自動將部份的藥物排泄出體外，於是為了補充被排掉的藥物，所以必須按時規律地服用以使藥物維持在有效的治療濃度。

### 假如我忘記服藥應該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。

### 為什麼我要抽血檢查？

服用此藥有時需要作血液檢查 CD4 數值、病毒量以及肝腎功能的相關生化檢查值，藉此以確認藥物的療效及是否引起任何可能之副作用。

### 如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 您正在使用其他藥物。
2. 您有任何的藥物過敏經驗。
3. 您已經懷孕或者計畫懷孕。
4. 您正在餵母乳。
5. 您有其他疾病。

### 使用抗 HIV 病毒藥物的一般原則：

1. 斷斷續續服藥極容易使病毒產生抗藥性，療效非常不好，因此請務必遵從醫師囑咐，按時服藥。
2. 使用抗 HIV 病毒藥物並不能避免病毒的傳染，請您從事性行為之前採取安全的防護措施，以保護您的伴侶。
3. 此份資料無法提供所有可能的注意事項及副作用，因此若是您服用藥物發生任何問題，請告知您的醫師或藥師。

### 藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。