



滋利特膠囊

Zerit® (Stavudine) 40mg/cap



滋利特是一種可抑制 HIV 病毒繁衍的藥物。**滋利特**適用於已接受長期 Zidovudine 療法之 HIV 感染患者。本院有 40 毫克暗橘色膠囊。

滋利特 可能引起之副作用？

滋利特與其他用於治療抗反轉錄病毒藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥若發生任何不適，請告知醫師或藥師。

滋利特最常見之副作用：頭痛、寒顫、發燒、腹瀉、皮疹、噁心、嘔吐、腹痛、肌痛、失眠、厭食、過敏反應、胰臟炎。

滋利特較嚴重之副作用：滋利特可能會引起週邊神經病變，此種情況與劑量有關並且較常發生於進展性 HIV 感染患者，或曾發生過週邊神經病變患者。週邊神經病變的症狀通常包括手部或腳部有刺痛、灼燒、疼痛或麻木感。若發生這些症狀必須告知醫師。

為什麼我必須按時規律地使用**滋利特**？

由於服用藥物一段時間，身體就會自動將部份的藥物排泄出體外，於是為了補充被排掉的藥物，所以必須按時規律地服用以使藥物維持在有效的治療濃度。

假如我忘記服藥應該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。

為什麼我要抽血檢查？

服用此藥有時需要作血液檢查 CD4 數值、病毒量以及肝腎功能的相關生化檢查值，藉此以確認藥物的療效及是否引起任何可能之副作用。

如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 您正在使用其他藥物。
2. 您有任何的藥物過敏經驗。
3. 您已經懷孕或者計畫懷孕。
4. 您正在餵母乳。
5. 您有其他疾病。

使用抗 HIV 病毒藥物的一般原則：

1. 斷斷續續服藥極容易使病毒產生抗藥性，療效非常不好，因此請務必遵從醫師囑咐，按時服藥。
2. 使用抗 HIV 病毒藥物並不能避免病毒的傳染，請您從事性行為之前採取安全的防護措施，以保護您的伴侶。
3. 此份資料無法提供所有可能的注意事項及副作用，因此若是您服用藥物發生任何問題，請告知您的醫師或藥師。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。