



班若舒錠 Benzox® (Trihexyphenidyl) 2 mg/tab



班若舒錠 可用於改善巴金森氏症引起之顫抖或肌肉僵硬等問題，亦可用於預防或治療因藥物引起的運動失調等問題。本院有**班若舒錠** 2 毫克白色錠劑。

在您服用**班若舒錠** 之前，您應該讓醫師或藥師知道您是否有下列情況：

1. 您正在使用其他藥物，其中包括非處方藥、營養補給藥品、草藥等。
2. 您有任何的藥物過敏經驗。
3. 您已經懷孕或者正計劃懷孕。
4. 您正在餵母乳。
5. 您有其他疾病，如青光眼、排尿困難、心臟疾病、高血壓、腎臟疾病、前列腺方面的問題、腸胃阻塞。

應該如何使用班若舒錠？

請按照醫師或藥師指示服藥。可與白開水一起服用。除非您的醫師或藥師有另外的指示。若您感到胃不舒服，則可與食物一起併用。請定期定量服用您的藥物，不要隨意增減藥量。

如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，請不要將兩次的劑量一起服用，直接省略一次劑量，然後依照原訂時間表規律的服用藥物。

服用班若舒錠時可能會發生哪些副作用？

班若舒錠 與其他用於治療巴金森氏症的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此，您使用此藥若發生任何不適或者有任何疑問，請通知您的醫師或藥師。

☆較常見：口乾、便秘、眩暈、亂視
劑量大時可能會有意識混亂的現象發生。

當您在服用班若舒錠期間，應該注意些什麼？

1. 請定期回診，讓您的醫師評估您整個病情的控制情況，並調整至最佳的藥物劑量。
2. 您在服藥期間可能會有嗜睡現象，請不要開車或操作機械。
3. 需要站起來或坐下時請慢慢的改變姿勢，尤其是老年人，如此便可以避免頭暈等現象。
4. 酒精或酒精性飲料會加重整個嗜睡情況，所以服藥期間應避免喝酒。
5. **班若舒錠** 會引起口乾舌燥等情況，您可以嚼口香糖或喝足量的水來改善此現象。
6. 服用**班若舒錠** 可能會對熱較敏感且流汗較少，請避免在過熱的環境下運動。
7. **班若舒錠** 可能需要好幾個禮拜才會達到理想治療效果，請耐心服用，千萬不要在沒有醫師的允許下擅自停藥。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。