



諾康停 Comtan® (Entacapone) 200mg/tab



多巴胺在體內的代謝需要一種酵素 COMT (Catechol-O-methyl transferase)。諾康停可以抑制 COMT 的活性，在體內可以減少左旋多巴胺在身體中的代謝，進而增加腦中左旋多巴胺的量，與美道普或心寧美等含有左旋多巴胺的藥物合併使用，治療巴金森症病人。本院有諾康停 200 毫克黃色錠劑。

在您服用諾康停之前，您應該讓醫師或藥師知道您是否有下列情況：

1. 您正在使用其他藥物，其中包括非處方藥、營養補給藥品、草藥等。
2. 您有任何的藥物過敏經驗。
3. 您已經懷孕或者正計劃懷孕。
4. 您正在餵母乳。
5. 您有其他疾病，如肝功能異常。

應該如何使用諾康停？

諾康停單獨使用不能用於治療巴金森症的病人，必須與含有左旋多巴胺的藥品，如：美道普或心寧美合併使用。諾康停可於飯前半小時或飯後一小時與一杯白開水一起吞服，若此藥物讓您感到胃不舒服，則可與食物一起併用。請配合醫師或藥師指示服用正確藥量，不要隨意增減藥量，也千萬不要在沒有醫師的允許下擅自停藥。

如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，請不要將兩次的劑量一起服用，直接省略一次劑量，然後依照原訂時間表規律的服用藥物。

服用諾康停時可能會發生哪些副作用？

諾康停與其他用於治療巴金森氏症的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此，您使用此藥若發生任何不適或者有任何疑問，請通知您的醫師或藥師。

☆較常見：腹瀉、眩暈、腹痛、失眠、口乾、便秘、幻覺、肌肉張力不足、汗液增加、運動過強、頭痛、腿痙攣、精神混亂、惡夢、跌倒、姿勢性低血壓、震顫

當您在服用諾康停期間，應該注意些什麼？

1. 服用諾康停時醫師會根據您的病況調整左旋多巴胺的藥量或是服藥的時間，請定期回診，讓您的醫師評估您整個病情的控制情況，並調整至最佳的藥物治療方式。
2. 需要站起來或坐下時請慢慢的改變姿勢，尤其是老年人，如此便可以避免頭暈等現象。
3. 諾康停與左旋多巴胺一起使用可能會引起暈眩，駕駛或操作機械時應特別小心。
4. 服用諾康停可能會使尿液變成紅棕色，但此現象並無害。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。