



帕登長效錠 Biperiden (Peden® Retard) 4mg/tab



帕登長效錠可改善因為巴金森氏症引起的僵直及顫抖，一般作為巴金森氏症的輔助治療藥物。本院有**帕登長效錠**4毫克白色錠劑。

在您服用**帕登長效錠**之前，您應該讓醫師或藥師知道您是否有下列情況：

1. 您正在使用其他藥物，其中包括非處方藥、營養補給藥品、草藥等。
2. 您有任何的藥物過敏經驗。
3. 您已經懷孕或者正計劃懷孕。
4. 您正在餵母乳。
5. 您有其他疾病，如癱瘓、精神病、胃潰瘍、臉、唇、舌部有不尋常的動作。

應該如何使用**帕登長效錠**？

請按照醫師或藥師指示服藥。服用時可與一杯白開水一起吞服。請配合醫師或藥師指示服用正確藥量，不要隨意增減藥量，也千萬不要在沒有醫師的允許下擅自停藥。

如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，請不要將兩次的劑量一起服用，直接省略一次劑量，然後依照原訂時間表規律的服用藥物。

服用**帕登長效錠**時可能會發生哪些副作用？

帕登長效錠與其他用於治療巴金森氏症的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此，您使用此藥若發生任何不適或者有任何疑問，請通知您的醫師或藥師。

☆ 較常見：暈眩、口乾、便秘、排尿困難、視力模糊

當您在服用**帕登長效錠**期間，應該注意些什麼？

1. 請定期回診讓您的醫師評估整個病情的控制情況，並調整至最佳的藥物劑量。
2. 需要站起來或坐下時請慢慢的改變姿勢，尤其是老年人，如此便可以避免頭暈等現象。
3. 您在服藥期間可能會有嗜睡或暈眩現象，請不要開車或操作機械。
4. 酒精或酒精性飲料會加重整個嗜睡、暈眩情況，所以服藥期間應避免喝酒。
5. 市面上有些非處方感冒藥品、抗過敏藥品可能會增加**帕登長效錠**的副作用，請不要自行購買服用。
6. **帕登長效錠**請避免與中樞神經抑制劑併用，以避免副作用的發生。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。