



## 森氏靜錠 Selegiline (Seginine®) 5 mg/tab



森氏靜錠可增加多巴胺(dopamine)的活性，也可以延緩巴金森氏症的病程惡化。本院有森氏靜錠5毫克白色錠劑。

在您服用森氏靜錠之前，您應該讓醫師或藥師知道您是否有下列情況：

1. 您正在使用其他藥物，其中包括非處方藥、營養補給藥品、草藥等。
2. 您有任何的藥物過敏經驗。
3. 您已經懷孕或者正計劃懷孕。
4. 您正在餵母乳。
5. 您有飲酒的習慣或是長期使用安眠藥或精神安定劑。
6. 您有其他疾病，如嚴重心血管疾病。

### 應該如何使用森氏靜錠？

請按照醫師或藥師指示服藥。森氏靜錠服用時可與一杯白開水一起吞服。請配合醫師或藥師指示服用正確藥量，不要隨意增減藥量，也千萬不要在沒有醫師的允許下擅自停藥。避免於晚間服用森氏靜錠。

### 如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，請不要將兩次的劑量一起服用，直接省略一次劑量，然後依照原訂時間表規律的服用藥物。

### 服用森氏靜錠時可能會發生哪些副作用？

森氏靜錠與其他用於治療巴金森氏症的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此，您使用此藥若發生任何不適或者有任何疑問，請通知您的醫師。

☆較常見：運動障礙(一種不正常的不隨意運動)、噁心、幻覺、混亂、暈眩、直立性低血壓及口乾、不正常的作夢、嗜睡、健忘、抑鬱、便秘、感覺異常、疲倦

### 當您在服用森氏靜錠期間，應該注意些什麼？

1. 請定期回診讓您的醫師評估整個病情的控制情況，並調整至最佳的藥物劑量。
2. 森氏靜錠會和含有 tyramine(例如：乳製品、乳酪等)的食物產生交互作用(尤其於高劑量下)而造成嚴重頭痛、血壓上升、及心跳不規律等症狀。
3. 需要站起來或坐下時請慢慢的改變姿勢，尤其是老年人，如此便可以避免頭暈等現象。
4. 酒精或酒精性飲料會加重整個嗜睡、暈眩情況，所以服藥期間應避免喝酒。
5. 市面上有些非處方感冒藥品、抗過敏藥品可能會增加森氏靜錠的副作用，請不要自行購買服用。
6. 若您即將接受手術，請告知您的醫師您正在使用森氏靜錠。

### 藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。