



## 歐普酪 膠囊

Volbro® (Bromocriptine) 2.5 mg/cap



巴金森氏症起因於病人腦內的多巴胺 (dopamine) 釋放不足，**歐普酪膠囊** 為多巴胺接受體的刺激物，可產生和多巴胺類似的效果，因此可用於巴金森氏症之治療。

**歐普酪膠囊** 也會阻斷一種叫 prolactin 的荷爾蒙在體內的釋放，進而影響月經週期及乳汁的分泌，所以**歐普酪膠囊** 可用於治療經期、生育方面、及乳汁不正常分泌等問題。

本院有 **歐普酪膠囊** 2.5 毫克膠囊。

在您服用 **歐普酪膠囊** 之前，您應該讓醫師或藥師知道您是否有下列情況：

1. 您正在使用其他藥物，其中包括非處方藥、營養補給藥品、草藥等。
2. 您有任何的藥物過敏經驗。
3. 您已經懷孕或者計劃懷孕。
4. 您正在餵母乳。
5. 您有其他疾病，如肝臟疾病、心臟疾病、高血壓或低血壓、精神異常、腹腔纖維化、癲癇。

應該如何使用 **歐普酪膠囊**？

請按照醫師或藥師指示服藥。服用時可與一杯白開水一起吞服，最好與食物一起服用。請配合醫師或藥師指示服用正確藥量，不要隨意增減藥量，也千萬不要在沒有醫師的允許下擅自停藥。

如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，請不要將兩次的劑量一起服用，直接省略一次劑量，然後依照原訂時間表規律的服用藥物。

服用 **歐普酪膠囊** 時可能會發生哪些副作用？

**歐普酪膠囊** 與其他藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此，您使用此藥若發生任何不適或者有任何疑問，請通知您的醫師或藥師。

☆較常見：便秘、嗜睡、口乾、頭暈、心悸、不正常自發性運動

劑量大時會有視力模糊和幻覺等現象發生。

當您在服用 **歐普酪膠囊** 期間，應該注意些什麼？

1. 請定期回診，讓您的醫師評估您整個病情的控制情況，並調整至最佳的藥物劑量。
2. 請教醫師您是否應定期測量血壓，尤其當您有嚴重頭痛時。
3. 您在服藥期間可能會有嗜睡現象，尤其是第一次服用時。所以宜睡前服用，但若非睡前服用則請不要開車或操作機械。
4. 需要站起來或坐下時請慢慢的改變姿勢，尤其是老年人，如此便可以避免頭暈等現象。
5. 酒精或酒精性飲料會加重整個嗜睡情況，所以服藥期間應避免喝酒。
6. **歐普酪膠囊** 會引起口乾舌燥等情況，您可以嚼口香糖或喝足量的水來改善此現象。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。