



英智

Amantadine (Enzil®) 100 mg/tab



英智可以用來控制巴金森氏症和類巴金森氏症。此外也可以用來預防及治療 A 型流行性感胃症狀。本院有**英智** 100 毫克白色錠劑。

在服用**英智**之前，您應該讓醫師或藥師知道您是否有下列情況：

1. 您正在使用其他藥物，其中包括非處方藥、營養補給藥品、草藥等。
2. 您有任何的藥物過敏經驗。
3. 您已經懷孕或者正計劃懷孕。
4. 您正在餵母乳。
5. 您有其它疾病，如溼疹、心臟疾病、腎臟疾病、肝臟疾病、精神異常、癲癇。

應該如何使用**英智**？

請按照醫師或藥師指示服藥，服用時可與一杯白開水一起吞服，若此藥物讓您感到胃不舒服，則可與食物一起併用。請配合醫師或藥師指示服用正確藥量，不要隨意增減藥量，也不要沒有醫師的允許下擅自停藥。

如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，請不要將兩次的劑量一起服用，直接省略一次劑量，然後依照原訂時間表規律的服用藥物。

服用**英智**時可能會發生哪些副作用？

英智與其他用於治療巴金森氏症的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此，您使用此藥若發生任何不適或者有任何疑問，請通知您的醫師或藥師。

☆較常見：視力改變、憂鬱、排尿困難、昏厥、

幻覺、皮膚出現紫斑、腿部水腫、煩躁、便秘、失眠、嗜睡、口乾、食慾減退

當您在服用**英智**期間，應該注意些什麼？

1. 請定期回診，讓您的醫師評估您整個病情的控制情況，並調整至最佳的藥物劑量。
2. 您在服藥期間可能會有嗜睡或暈眩現象，請不要開車或操作機械。
3. 需要站起來或坐下時請慢慢的改變姿勢，尤其是老年人，如此便可以避免頭暈等現象。
4. 酒精或酒精性飲料會加重嗜睡現象，所以服藥期間應該避免喝酒。
5. 當您服用**英智**之後，覺得症狀有改善時，活動量不要增加太多，以便讓身體慢慢調適。
6. **英智**可能會引起口乾舌燥等情況，您可以嚼口香糖或喝足量的水來改善此現象。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。