



## 力必平 Ropinirole (Requip®) 0.25mg/tab



**力必平**是多巴胺 (dopamine) 接受體的強力催動劑，可以單獨使用治療原發性巴金森病，或是加入左旋多巴胺 (levodopa) 的療程中，可用以控制病情的波動現象，並可減少左旋多巴胺的每日總劑量。

在您服用**力必平**之前，您應該讓醫師或藥師知道您是否有下列情況：

1. 您正在使用其他藥物，其中包括非處方藥、營養補給藥品、草藥等。
2. 您有任何的藥物過敏經驗。
3. 您已經懷孕或者正計劃懷孕。
4. 您正在餵母乳。
5. 您有飲酒的習慣或是長期使用安眠藥或精神安定劑。
6. 您有其他疾病，如嚴重心血管疾病。

**應該如何使用力必平？**

**力必平**可於飯前半小時或飯後一小時與一杯白開水一起吞服，若此藥物讓您感到胃不舒服，則可與食物一起併用。請配合醫師或藥師指示服用正確藥量，不要隨意增減藥量，也千萬不要在沒有醫師的允許下擅自停藥。

**如果您忘記服藥該怎麼辦？**

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，請不要將兩次的劑量一起服用，直接省略一次劑量，然後依照原訂時間表規律的服用藥物。

**服用力必平時可能會發生哪些副作用？**

**力必平**與其他用於治療巴金森氏症的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此，您使用此藥若發生任何不適或者有任

何疑問，請通知您的醫師。

- ☆較常見：噁心、嗜睡、腿部水腫、腹痛、嘔吐、暈厥、姿勢性低血壓
- ☆較少見：運動困難、幻覺、消化不良、意識混淆

**當您在服用力必平期間，應該注意些什麼？**

1. 請定期回診，讓您的醫師評估您整個病情的制情況，並調整至最佳的藥物治療方式。
2. 需要站起來或坐下時請慢慢的改變姿勢，尤其是老年人，如此便可以避免頭暈等現象。
3. 使用**力必平**時，駕駛車輛或操作機械時應特別小心，必要時請避免開車及參加其他可能發生危險的活動。

**藥品保存方式：**

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。