



卡馬平錠 Camapine® (Carbamazepine) 200mg/tab



卡馬平錠 為一種抗癲癇藥物，對部份發作及全盤性強直陣攣發作（大發作）有良好的治療效果。部份病人可單獨使用 **卡馬平錠** 完全控制癲癇的發作，但有些病人必須合併使用第二種藥物。

卡馬平錠 可能引起之副作用？

卡馬平錠 與其他用於治療癲癇的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥若發生任何不適，請告知醫師或藥師。

早期之副作用：剛開始治療較常見之副作用包括：複視、頭痛、噁心、嗜睡、暈眩。這些副作用通常在身體對藥物適應或調整劑量後就會消失。

後期之副作用：若是長期使用才出現複視、頭痛、噁心、嗜睡、暈眩等副作用，表示您使用藥物的劑量需要調整。另外使用此藥偶爾會胃痙攣的情形。

較少見副作用：可能引起血球方面的異常而造成發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍或者不尋常之出血、瘀斑等。如果這些症狀持續，請立刻告知您的醫生。

皮膚疹：可能造成過敏性皮膚疹。有些病人在使用此藥時引起皮膚疹，如果這些症狀持續，請立刻告知您的醫生。

如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。

當您在服用鎮頑癲 期間，應該注意些什麼？

1. 請定期回診，讓您的醫師幫您做一些檢

- 查，藉此以確認藥物是否引起任何可能之反應。
2. 您在服藥期間可能會有嗜睡現象，請不要開車或操作機械。
 3. 請按時服用，千萬不要在沒有醫師的允許下自行停藥。

卡馬平錠 是否可以與食物或其他藥物一起服用？

一般狀況下可以與食物或其他藥物一起服用，但最好將您服用之其他藥物讓醫師知道才可作最好的評估。必須注意的是有些藥，如：抗生素（紅黴素；Erythromycin）及胃藥（祛潰；Cimetidine）可能會使此藥產生更多的副作用，因此應該避免同時使用。並請勿同時飲用酒精性飲料。

如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 您正在使用其他藥物或經常使用酒精性飲料
2. 您有任何的藥物過敏經驗
3. 您已經懷孕或者計畫懷孕
4. 您正在餵母乳
5. 您有其他疾病

使用抗癲癇藥物的一般原則：

1. 最重要的是不可自行突然停藥。如果有必要停藥，您的醫師會與您溝通，並密切觀察停藥的反應。
2. 請與您的醫師討論癲癇發作與使用抗癲癇藥物對懷孕、精神狀態及駕駛車輛的影響。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。