



帝拔癲 200 毫克

帝拔癲 500 毫克

帝拔癲液

帝拔癲 Depakine® (Valproic acid)



帝拔癲為一種抗癲癇藥物，對全盤性強直陣攣發作(大發作)，肌抽躍發作，癲通為一種抗癲癇藥物，對部份發作及全盤性強直陣攣發作(大發作)有良好的治療效果。部份病人可單獨使用**帝拔癲**完全控制癲癇的發作，但有些病人必須合併使用第二種藥物。本院有**帝拔癲** 200 毫克腸溶錠、500 毫克持續性膜衣錠、每毫升 200 毫克的**帝拔癲液**及每支 400 毫克的**帝拔癲**注射劑。

服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。

當您在服用**樂命達錠**期間，應該注意些什麼？

1. 請定期回診，讓您的醫師幫您做一些檢查，藉此以確認藥物是否引起任何可能之反應。
2. 請按時服用，千萬不要在沒有醫師的允許下自行停藥。

帝拔癲可能引起之副作用？

如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 您正在使用其他藥物或經常使用酒精性飲料
2. 您有任何的藥物過敏經驗
3. 您已經懷孕或者計畫懷孕
4. 您正在餵母乳
5. 您有其他疾病

使用抗癲癇藥物的一般原則：

1. 最重要的是不可自行突然停藥。如果有必要停藥，您的醫師會與您溝通，並密切觀察停藥的反應。
2. 請與您的醫師討論癲癇發作與使用抗癲癇藥物對懷孕、精神狀態及駕駛車輛的影響。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。

1. 有些報告指出使用**帝拔癲**造成掉頭髮。但是這種現象通常只會維持幾個月，然後頭髮會再重新長出來。
2. 有些人使用**帝拔癲**會發生顫抖的情形。這表示您使用藥物的劑量可能過高。請您務必告知您的醫師。
3. **帝拔癲**可能會增加食慾而造成體重增加。若是您對體重增加感到困擾，請控制您的飲食。
4. 開始治療時有些人會產生腸胃刺激不適的情形，通常不須停藥，幾天後就會消失。
5. **帝拔癲**可能造成出血時間的延長。因此當您看牙醫或進行手術時請告知您的醫師。
6. 服用**帝拔癲**有一罕見的副作用是肝功能障礙。可能出現的症狀包括黃疸、紅疹、疲勞及食慾不佳。因此有肝功能障礙之病人不宜使用**帝拔癲**。極罕見的狀況為服用**帝拔癲**發生胰臟炎，而導致嚴重的腹痛。

如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起