



服利寧錠 Clobazam (Frisium®) 10mg/tab



服利寧為一種抗癲癇藥物，通常作為第二線（輔助）用藥。對不能以抗癲癇藥物來穩定癲癇的病患，或是特別發生於女性生理期前後的發作，可附加**服利寧**來治療。此藥還可用於治療其他病症，請諮詢您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

本院有**服利寧**10毫克錠劑。

服利寧可能引起之副作用？

服利寧與其他用於治療癲癇的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥若發生任何不適，請告知醫師或藥師。

最常見的副作用：

嗜睡、疲勞、頭痛、噁心、暈眩、姿勢性低血壓及精神與運動方面的失調等。有些病患可能發生反應時間變慢、說話模糊、視覺障礙、精神紊亂等情形。

較少見的副作用：

靜坐不能與肌肉無力。對有腦損傷或呼吸道疾病的病患，可能會產生呼吸道障礙。

如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。

當您在服用服利寧**期間，應該注意些什麼？**

1. 您在服藥期間可能會有嗜睡現象，請不要

開車或操作機械。

2. 請按時服用，千萬不要在沒有醫師的允許下自行停藥。

如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 您正在使用其他藥物或經常使用酒精性飲料
2. 您有任何的藥物過敏經驗
3. 您已經懷孕或者計畫懷孕
4. 您正在餵母乳
5. 您有其他疾病

服利寧是否可以與食物或其他藥物一起服用？

使用**服利寧**若併服其他的中樞神經抑制劑則會加強其藥效。如果**服利寧**與抗癲癇藥併服時，則需經由定期的監控來決定劑量，因為**服利寧**可能與其他抗癲癇藥物產生交互作用。而**服利寧**與癲癇能停併用會加強及延長**服利寧**的作用。請勿同時服用**服利寧**及飲用酒精性飲料。

使用抗癲癇藥物的一般原則：

1. 最重要的是不可自行突然停藥。如果有必要停藥，您的醫師會與您溝通，並密切觀察停藥的反應。
2. 請與您的醫師討論癲癇發作與使用抗癲癇藥物對懷孕、精神狀態及駕駛車輛的影響。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。