



樂命達錠 Lamotrigine (Lamictal®) 100mg/tab



樂命達錠為一種抗癲癇藥物，可單獨使用或併用來治療某些類型的癲癇發作。此藥還可用於治療其他病症，請諮詢您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

樂命達錠 可能引起之副作用？

樂命達錠與其他的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥若發生任何不適，請告知醫師或藥師。

單獨使用之副作用：頭痛、疲倦、皮膚疹、嘔吐、暈眩、嗜睡及失眠。

與其他抗癲癇藥物一起使用之副作用：複視、視力模糊、頭痛、暈眩、嗜睡、疲勞、胃腸障礙、不安躁動等副作用。

皮膚疹：**樂命達錠**可能會造成皮膚疹，且通常發生在使用**樂命達錠**的前八週。這些副作用有些在身體對藥物適應或調整劑量後就會消失。但是如果發生罕見的皮膚病變，包括：血管水腫或全身性皮膚腫痛的現象，請立刻告知您的醫師或藥師。

如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。

當您在服用樂命達錠 期間，應該注意些什麼？

1. 請定期回診，讓您的醫師幫您做一些檢查，藉此以確認藥物是否引起任何可能之反應。

2. 您在服藥期間可能會有嗜睡現象，請不要開車或操作機械。
3. 請按時服用，千萬不要在沒有醫師的允許下自行停藥。

如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 您正在使用其他藥物或經常使用酒精性飲料
2. 您有任何的藥物過敏經驗
3. 您已經懷孕或者計畫懷孕
4. 您正在餵母乳
5. 您有其他疾病

使用抗癲癇藥物的一般原則：

1. 最重要的是不可自行突然停藥。如果有必要停藥，您的醫師會與您溝通，並密切觀察停藥的反應。
2. 請與您的醫師討論癲癇發作與使用抗癲癇藥物對懷孕、精神狀態及駕駛車輛的影響。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。