



樂命達

可溶咀嚼錠

Lamotrigine (Lamictal®)
Dispersible/Chewable 5mg/tab



樂命達為一種抗癲癇藥物，可單獨使用或併用來治療某些類型的癲癇發作。此藥還可用於治療其他病症，請諮詢您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

樂命達可能引起之副作用？

樂命達與其他的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥若發生任何不適，請告知醫師或藥師。

單獨使用之副作用：頭痛、疲倦、皮膚疹、嘔吐、暈眩、嗜睡及失眠。

與其他抗癲癇藥物一起使用之副作用：複視、視力模糊、頭痛、暈眩、嗜睡、疲勞、胃腸障礙、不安躁動等副作用。

皮膚疹：**樂命達**可能會造成皮膚疹，且通常發生在使用**樂命達**的前八週。這些副作用有些在身體對藥物適應或調整劑量後就會消失。但是如果發生罕見的皮膚病變，包括：血管水腫或全身性皮膚腫痛的現象，請立刻告知您的醫師或藥師。

如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，那麼請不要將兩次的劑量一起服用。請直接省略一次劑量，根據原來應該服藥時間服用下一次的劑量。然後依照原訂時間表規律服用藥物。

當您在服用樂命達期間，應該注意些什麼？

1. 請定期回診，讓您的醫師幫您做一些檢查，

藉此以確認藥物是否引起任何可能之反應。

2. 您在服藥期間可能會有嗜睡現象，請不要開車或操作機械。

3. 請按時服用，千萬不要在沒有醫師的允許下自行停藥。

如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 您正在使用其他藥物或經常使用酒精性飲料

2. 您有任何的藥物過敏經驗

3. 您已經懷孕或者計畫懷孕

4. 您正在餵母乳

5. 您有其他疾病

使用抗癲癇藥物的一般原則：

1. 最重要的是不可自行突然停藥。如果有必要停藥，您的醫師會與您溝通，並密切觀察停藥的反應。

2. 請與您的醫師討論癲癇發作與使用抗癲癇藥物對懷孕、精神狀態及駕駛車輛的影響。

藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。

2. 藥物放置處應遠離兒童。

3. 不要將藥物與他人分享。