



## 利福全 Rivotril® (Clonazepam) 0.5mg/tab



**利福全**為一種抗癲癇藥物，對嬰兒型痙攣、肌痙攣、強直型、失張型及陣攣型發作治療效果良好。此藥另外可用於放鬆肌肉、緩解焦慮。本院有**利福全**0.5 毫克錠劑。

### 利福全可能引起之副作用？

**利福全**與其他的藥物一樣可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用此藥若發生任何不適，請告知醫師或藥師。

**最常見的副作用：**嗜睡、疲勞及行為失調。有些病患可能發生精神紊亂、說話模糊、視覺障礙、顫抖及噁心等情形。

**較少見副作用：**肝功能異常、造血功能障礙。

### 應該如何使用利福全？

**利福全**是口服錠劑，請與一杯白開水一起吞服。請配合醫師或藥師指示服用正確藥量，不要隨意增減藥量，也千萬不要在沒有醫師的允許下擅自停藥。

### 如果您忘記服藥該怎麼辦？

如果您忘記一次劑量，請您於想起來後儘快服用所忘記之藥量。但是若您想起的時間已經接近下一次吃藥時間，請不要將兩次的劑量一起服用，直接省略一次劑量，然後依照原訂時間表規律的服用藥物。

### 利福全是否可以與食物或其他藥物一起服用？

一般狀況下**利福全**可以與食物或其他藥物一起服用，但最好將您服用之其他藥物讓醫師知道才可作最好的評估。並請勿同時服用**利福全**及飲用酒精性飲料。

### 當您在服用利福全期間，應該注意些什麼？

請定期回診，讓您的醫師幫您做一些檢查，藉此以確認藥物是否引起任何可能之反應。

### 如果您有以下狀況，請於服藥前告知您的醫師：

1. 您正在使用其他藥物或經常使用酒精性飲料
2. 您有任何的藥物過敏經驗
3. 您已經懷孕或者計畫懷孕
4. 您正在餵母乳
5. 您有其他疾病

### 藥品保存方式：

1. 將藥物存放在室溫避光的地方，遠離熱源及濕氣。
2. 藥物放置處應遠離兒童。
3. 不要將藥物與他人分享。